

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау және
өлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және
фармацевтикалық қызметті
бақылау комитеті Терагасының
2016 жылғы "14" 09
№ N003915 бүйрүбаймен
БЕКІТЛГЕН

071307/5001 KZ

Mat.no.: 071307
Version: 5001
Code: 142
Size: 110 x 440 mm
Type size: ≥ 8 Punkt
Colours: ■ Pantone 432

**Дәрілік затты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық**

ХЕПЕЛЬ Н

Саудалық атапы
ХЕПЕЛЬ Н

Халықаралық патенттелмеген атапы
Жоқ

Дәрілік түрі
Таблеткалар

Құрамы

Бір таблетканың құрамында

Белсенәлі заттар:

Chelidonium majus D6	30.0 мг
Citrullus colocynthis D6	90.0 мг
Myristica fragrans D4	30.0 мг
Phosphorus D6	15.0 мг
Veratrum album D6	60.0 мг
Cinchona pubescens D3	30.0 мг
Lycopodium clavatum D3	30.0 мг
Silybum marianum D2	15.0 мг

қосымша заттар - магний стеараты.

Сипаттамасы

Ақ түстен қызыл сары-ақ түске дейін болатын, дөңгелек пішінді, беті тегіс, ойыры бар, иіссіз таблеткалар. Мезгіл-мезгіл бетінде қызыл сары теңбілдер пайдада болуы мүмкін.

Фармакотерапиялық тобы

Бауыр ауруларын емдеуге арналған препараттар. ATX коды A05VA

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Гомеопатиялық препараттардың фармакокинетикалық қасиеттерін зерттеу мүмкін емес.

Фармакодинамикасы

ХЕПЕЛЬ Н – кешенді гомеопатиялық препарат. Гепатопротекторлық, спазмолитикалық, ет айдағыш, қабынуға қарсы, диареяға қарсы әсерлері бар, олар препараттың құрамына кіретін заттардың есебінен, организмінің қорғаныш күштерін белсенділіндірге және бұзылған функциясын қалыпқа келтіруге негізделеді.

Қолданылуы

- бауыр функциясының алғашқы және екінші қайтара болған бұзылуларында

Қолдану тәсілі және дозалары

Бір реттік доза: ересектерге тіл астына 1 таблеткадан (толық сорылғанша). Бір реттік дозаны тамақтанудан 15-20 минут бұрын немесе тамақтанудан кейін 1 сағаттан соң күніне 3 рет қабылдау керек.

Ауру жедел басталған жағдайда бір реттік дозаны әрбір 15 минут сайын 2 сағат бойы қабылдау керек. Әрі қарай күніне 3 рет қабылдауға көшу керек.

Емдеу курсы жедел ағынды ауруларда – 7-14 күн, созылмалы ауруларда – 2-6 апта.

Жағымсыз әсерлері

Барлық дәрілер сияқты бұл гомеопатиялық дәрі жағымсыз әсерлерді тудыруы мүмкін. Жекелеген жағдайларда қысқа мерзімді терінің аллергиялық реакциялары туралы хабарланған.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препарат компоненттеріне, соның ішінде Carduus marianus немесе курделі гүлділер (Asteraceae) тұқымдасына жататын өсімдіктерге, хининге жогары сезімталдықта - жүктілік және лактация кезеңінде

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Кешенді гомеопатиялық препараттардың тағайындау осы ауруларда қолданылатын басқа да дәрілік заттарды пайдалануды жоққа шығармайды.

Айрықша нұсқаулар

Препаратты жасап шыгарғанда лактоза пайдаланылады. Лактозаны көтере алмау-шылығы, Lapp-лактаза ферментінің тапшылығы, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы бар пациенттерге препаратты қабылдауға болмайды.

Анамнезде курделі бауыр ауруы бар пациенттерге, препаратты қабылдар алдында дәрігермен кеңескен жөн.

Егер симптомдары тұрақты сақталса немесе нашарласа, дәрігерден кеңес алған жөн.

Педиатрияда қолданылуы

Осы препаратты балаларға қолдану тәжірибелі құжаттық түрғыдан жеткілікті айғағталмалғандықтан, 18 жасқа дейінгі балаларға препаратты қолдануға болмайды.

Дәрілік заттың көлікті немесе қауіпті механизмдері басқару қабілетінен ықлап ету ерекшеліктері

Белгісіз.

Артық дозалануы

Бірде-бір препараттың артық дозалану жағдайы тіркелемеген және гомеопатиялық сыйылтуға байланысты күтілмейді.

Шығарылу түрі және қантамасы

Ақ полипропиленнен жасалған қақпағы бар ақ полипропилен контейнерге 50 таблет-кадан салынған.

1 контейнерден медициналық қолдану жөнінде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшага салынған.

Сақтау шарттары

Тұпнұсқалық қантамасында, 30°C-ден аспалтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

5 жыл

Қантамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханадан босатылу шарттары

Рецептісіз

Өндіруші

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Tіркеу күөлігінің иесі

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Қазақстан Республикасы аумағында: тұтынушылардан дәрілік заттың сапасына қатысты шағымдарды (усыныстарды) қабылдайтын; дәрілік заттың тіркеуден кейінегі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты үйімнің атапы және мекенжайы «AEM Services» ЖШС

050040, ҚР, Алматы қ-сы, әл-Фараби д-лы, 75А үй, 102-103 көнсө

aemservices@mail.ru

+7 707 798 83 83

1. Proof 21.09.2016 PAS

2. Proof 23.09.2016 Ell

3. Proof 03.01.2017 AB

4. Proof 04.01.2017 AB

5. Proof 10.01.2017 PAS

6. Proof 11.01.2017 PAS

7. Proof 12.01.2017 PAS

Correction necessary

Approved for printing

Valid until _____

Valid until further note

Date/Signature

12.01.2017

Nyssanbayeva A.T.

-Heel

-Heel

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от «14» 09 2016 г.
№ N003915

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства**

ХЕПЕЛЬ Н

Торговое название
ХЕПЕЛЬ Н

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

Одна таблетка содержит

активные вещества:

Chelidonium majus D6	30.0 мг
Citrullus colocynthis D6	90.0 мг
Myristica fragrans D4	30.0 мг
Phosphorus D6	15.0 мг
Veratrum album D6	60.0 мг
Cinchona pubescens D3	30.0 мг
Lycopodium clavatum D3	30.0 мг
Silybum marianum D2	15.0 мг,

вспомогательное вещество - магния стеарат.

Описание

Таблетки от белого до оранжево-белого цвета, круглой формы, с плоской поверхностью, с фаской, без запаха. Время от времени на поверхности могут быть оранжевые вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний печени.

Код ATX A05BA

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Исследовать фармакокинетические свойства гомеопатических препаратов не представляется возможным.

Фармакодинамика

ХЕПЕЛЬ Н – комплексный гомеопатический препарат. Обладает гепатопротекторным, спазмолитическим, желчегонным, противовоспалительным, антидиарейным действием, которое основывается на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ, входящих в состав препарата.

Показания к применению

- первичные и вторичные нарушения функций печени

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым по 1 таблетке под язык (до полного рассасывания). Разовую дозу принимать 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 1 час после еды. В случае острого начала заболевания принимать разовую дозу каждые 15 минут на протяжении 2 часов. В дальнейшем перейти на приём 3 раза в день.

Курс лечения при острых заболеваниях – 7-14 дней, при хронических заболеваниях – 2-6 недель.

Побочные действия

Как и все лекарства, это гомеопатическое лекарство может вызывать побочные эффекты. В единичных случаях сообщалось о кратковременной кожной аллергической реакции.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к Carduus marianus или другим растениям семейства сложноцветных (Asteraceae), хинину
- беременность и период лактации

Лекарственные взаимодействия

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При производстве препарата используется лактоза. Пациенты с непереносимостью лактозы, дефицитом фермента Lapp-лактазы и мальабсорбией глюкозы-галактозы не должны применять препарат.

Пациентам с серьезными заболеваниями печени в анамнезе, следует проконсультироваться с врачом перед началом приема препарата.

Если симптомы устойчиво держатся или ухудшаются, следует проконсультироваться у врача.

Применение в педиатрии

Поскольку опыт использования данного препарата детьми не имеет достаточного документального подтверждения, то детям до 18 лет принимать препарат не следует.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не известны.

Передозировка

Ни одного случая передозировки не зарегистрировано и не ожидается в связи с гомеопатическим разведением.

Форма выпуска и упаковка

По 50 таблеток помещают в белый полипропиленовый контейнер с белой полипропиленовой крышкой.

По 1 контейнеру вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Адрес организации на территории Республики Казахстан: принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей; ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «AEM Services»

050040, РК, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 102-103

aemservices@mail.ru

+7 707 798 83 83