

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және
фармацевтикалық қызметті
бақылау комитеті Төрағасының
2017 жылғы “20” 01
№ N006236 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

071324/5001 KZ

Дәрілік затты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық

ГРИПП-ХЕЕЛЬ

Саудалық атауы
ГРИПП-ХЕЕЛЬ

Халықаралық патенттелмеген атауы
Жоқ

Дәрілік түрі
Таблеткалар

Құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді заттар:

Aconitum napellus D4	120.0 мг
Врюния D4	60.0 мг
Lachesis mutus D12	60.0 мг
Eupatorium perfoliatum D3	30.0 мг
Phosphorus D5	30.0 мг

қосымша заттар: магний стеараты, лактоза моногидраты.

Сипаттамасы

Дөңгелек пішінді, беті тегіс, ақтан ақшыл сары түске дейінгі, сызығы бар, иіссіз таблеткалар. Жекелеген жағдайларда таблетканың бетінде көрінетін қара және сары дақтарға жол беріледі.

Фармакотерапиялық тобы

Суық тиюдін симптомдарын жоюға арналған басқа препараттардың біріктірілімі.
ATX коды R05X

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Гомеопатиялық препараттардың фармакокинетикалық қасиеттерін зерттеу мүмкін емес.

Фармакодинамикасы

Препарат, препарат құрамына кіретін заттардың есебінен организмнің қорғаныс күшін белсендіруге және бұзылған функцияларды қалпына келтіруге негізделген дезинтоксикациялық, қабынуға қарсы, иммунитетті қалпына келтіретін әсер етеді.

Қолданылуы

- жоғары қызбамен және айқын интоксикациямен жүретін тұмау, ЖРВИ емдеуде
- тұмау және ЖРВИ профилактикасында
- айқын қызба және интоксикациямен басқа инфекциялық ауруларда

Қолдану тәсілі және дозалары

Ересектер үшін бірреттік доза – тамаққа дейін немесе тамақтанғаннан кейін 1 сағаттан соң тіл астына 1 таблетка (толық сорғанға дейін). Әдетте күніне 3-5 рет 1 таблеткадан тағайындалады. Жедел жағдайларда алғашқы екі сағат ішінде әр 15 минут сайын бір реттік дозаны тіл астына (толық сорғанға дейін) қабылдайды. Жағдай жақсарған кезде тамақтанғанға дейін 15 минут бұрын немесе бір сағат кейін күніне 3 рет қабылдауға көшуге болады. Емдеу курсы 5-10 күн. Ауру симптомдары жоғалғаннан кейін асқынулардың профилактикасы мақсатында препаратты тағы 5-7 күн ішінде тәулігіне 2 рет қабылдауды жалғастыру ұсынылады. Профилактикалық мақсатта таблеткаларды үнемі қабылдау ұсынылады: күз-қыс мезгілінде күніне 1 рет 1 таблеткадан (таңертең), ал тұмау эпидемиясы кезеңінде күніне 2 рет (таңертең және кешке).

Жағымсыз әсерлері

- аллергиялық реакциялар болуы мүмкін

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препарат компоненттеріне аса жоғары сезімталдық

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі анықталмаған.

Айрықша нұсқаулар

Клиникалық көрініс толығымен қалпына келгеннен кейін организмнің толық детоксикациясы мақсатында тағы 3-5 күн ішінде препаратты қабылдауды жалғастыру ұсынылады. Препараттың құрамында лактоза бар, сондықтан лактозаны көтере алмайшылық, Lарр-лактоза ферментінің тапшылығы және глюкоза-галактоза мальабсорбциясы бар пациенттерге препаратты қабылдауға болмайды.

Жүктілік және лактация кезеңі

Тек қана дәрігерден алдын ала кеңес алғаннан кейін ғана қолдануға болады.

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер етпейді.

Артық дозалануы

Препараттың артық дозалану жағдайлары сипатталмаған.

Шығарылу түрі және қаптамасы

50 таблеткадан полипропиленнен жасалған тығын-қақпағы бар полипропилен контейнерге салынған.

1 контейнерден медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.

Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамасында, 9°C-ден 29°C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

5 жыл

Қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецептсіз

Өндіруші

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Тіркеу куәлігінің иесі

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан: дәрілік заттың сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын; дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы

«АЕМ Services» ЖШС

050040, ҚР, Алматы, әл-Фараби д-лы, 75А үй, 102-103 кеңсе

aemservices@mail.ru

+7 707 798 83 83

Mat.no.: 071324

Version: 5001

Code: 186

Size: 110 x 440 mm

Type size: ≥ 8 Punkt

Colours: ■ Pantone 432

1. Proof ___06.03.2017___AB

2. Proof ___08.03.2017___EII

Correction necessary

Approved for printing

Valid until _____

Valid until further note

Date/Signature

Nyssonbayeva A.T.

09.03.2017

-Heel

-Heel

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от «20» 01 2017 г.
№ N006236

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства**

ГРИПП-ХЕЕЛЬ

Торговое название
ГРИПП-ХЕЕЛЬ

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма
Таблетки

Состав

Одна таблетка содержит
активные вещества:

Aconitum napellus D4	120.0 мг
Bryonia D4	60.0 мг
Lachesis mutus D12	60.0 мг
Eupatorium perfoliatum D3	30.0 мг
Phosphorus D5	30.0 мг

вспомогательные вещества: магния стеарат, лактозы моногидрат.

Описание

Таблетки круглой формы, с плоской поверхностью, от белого до желто-белого цвета, с фаской, без запаха. В отдельных случаях на поверхности таблеток допускаются видимые черные и желтые пятна.

Фармакотерапевтическая группа

Другие комбинации препаратов для устранения симптомов простуды.
Код АТХ R05X

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Исследовать фармакокинетические свойства гомеопатических препаратов не представляется возможным.

Фармакодинамика

Препарат оказывает дезинтоксикационное, противовоспалительное, иммунокорригирующее действие, которое основывается на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ, входящих в состав препарата.

Показания к применению

- лечение гриппа, ОРВИ, протекающих с высокой лихорадкой и выраженной интоксикацией
- профилактика гриппа и ОРВИ
- другие инфекционные заболевания с выраженной лихорадкой и интоксикацией

Способ применения и дозы

Разовая доза для взрослых – 1 таблетка под язык (до полного рассасывания) до еды или через 1 час после еды. Обычно назначается по 1 таблетке 3-5 раз в день. В острых случаях принимать разовую дозу сублингвально (до полного рассасывания) каждые 15 минут в течение первых двух часов.

При улучшении состояния перейти на приём 3 раза в день за 15 мин. до еды или через один час после. Курс лечения 5 – 10 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки еще в течение 5 – 7 дней с целью профилактики осложнений

С профилактической целью рекомендуется постоянно принимать таблетки: в осенне-зимний период по таблетке 1 раз в день (утром), а в период эпидемии гриппа 2 раза в день (утром и вечером).

Побочные действия

- возможны аллергические реакции

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не установлены.

Особые указания

После полной нормализации клинической картины рекомендуется продолжить приём препарата ещё в течение 3-5 дней с целью полной детоксикации организма. Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с непереносимостью лактозы, дефицитом фермента Lapp-лактазы и мальабсорбцией глюкозы-галактозы не должны применять препарат.

Беременность и период лактации

Применять только после предварительной консультации с врачом.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не описаны.

Форма выпуска и упаковка

По 50 таблеток помещают в полипропиленовый контейнер с крышкой-пробкой из полипропилена.

По 1 контейнеру вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 9 °С до 29 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Адрес организации на территории Республики Казахстан: принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей; ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «АЕМ Services»

050040, РК, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 102-103

aemservices@mail.ru

+7 707 798 83 83

-Heel