

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрлігі
Медициналық және
фармацевтикалық қызметті
бақылау комитеті Төрағасының
2016 жылғы “24” 11
№ N005110 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН
082550/5000 KZ

**Дәрілік затты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық**

ЦЕЛЬ

Саудалық атауы

Цель

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі

Таблеткалар

Бір таблетканың құрамында

белсенді заттар:

Cartilago suis D4	0.30 ¹ мг
Coenzym A D6	0.03 ¹ мг
Embryo totalis suis D4	0.30 ¹ мг
Funiculus umbilicalis suis D4	0.30 ¹ мг
Nadidum D6	0.03 ¹ мг
Placenta totalis suis D4	0.30 ¹ мг
Rhus toxicodendron D2	0.54 ¹ мг
Sanguinaria canadensis D3	0.45 ¹ мг
Solanum dulcamara D2	0.15 ¹ мг
Sulfur D6	0.54 ¹ мг
Symphytum officinale D8	0.15 ¹ мг
Arnica montana MT=D1	0.60 ¹ мг
Acidum silicicum D6	3.00 мг
Acidum thiocticum D6	0.03 мг
Natrium diethylxalacetatum D6	0.03 мг

қосымша заттар:

лактоза моногидраты 296.94 мг, магний стеараты 1.5 мг

¹ – сулы-спиртті сұйылтылған түрінде пайдаланылады, су және этанол өндіріс үдерісінде жойылады

Сипаттамасы

Иісі жоқ, ойығы бар, ақтан сарғыш-ақшыл түске дейінгі, беті тегіс, дөңгелек пішінді таблеткалар.

Фармакотерапиялық тобы

Тірек-қимыл аппараты ауруларын емдеуге арналған басқа да препараттар.

АТХ коды M09AX

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Гомеопатиялық препараттардың фармакокинетикалық қасиеттерін зерттеу мүмкін емес.

Фармакодинамикасы

Цель кешенді гомеопатиялық препарат болып табылады. Цель сіңірлердің зақымдануына қарсы қорғағыш әсер етеді және реттегіш белсендіру жасушалары және факторлары арқылы сіңірлердің қайта қалпына келуін жеңілдетеді. Препараттың әсері организмнің белсенді қорғағыш күшімен және препараттың құрамындағы затқа байланысты бұзылған функциялардың қалпына келтірумен негізделген.

Қолданылуы

Артроз/остеоартрит және/немесе буындардың ревматизмдік ауруларында.

Қолданылу тәсілі және дозасы

Қолдану тәсілі және дозалануы:

Стандартты доза:

Ересектер (және 12 жасан асқан балалар):

Күніне 3 рет 1 таблеткадан.

6-11 жастағы балалар: күніне 2 рет 1 таблетка.

Жедел жағдайларда алғашқы дозалануы:

Ересектер (және 12 жасан үлкен балалар):

Әрбір ½ сағатта-1 сағатта 1 таблеткадан күнделікті 12 таблеткаға дейін, одан кейін стандартты дозада жалғастыру керек.

6-11 жастағы балалар: әрбір 1-2 сағатта 1 таблеткадан, күніне 8 рет, одан кейін стандартты дозада жалғастыру керек.

Емдеу ұзақтығы

Жедел жағдайда бастапқы дозаны бірнеше күн қолданылады, әдетте 2-ден 3 күнге дейін.

Стандартты ем шамамен 1-2 айға созылады.

Қолдану тәсілі:

Ішке.

Дұрысы таблетканы ауызда ерітіп, содан соң жұтқан жөн.

Балаларға таблетканы ұнтақтап салып судың аздаған мөлшерімен беруге болады. Бұл дәрі аш қарынға немесе тағам қабылдау арасындағы аралығында қабылданыу тиіс.

Жағымсыз әсерлері

Басқа дәрілік заттар сияқты бұл гомеопатиялық дәрі де жағымсыз әсер туындатуы мүмкін. Бірлі-жарым жағдайларда қысқа мерзімдік терінің аллергиялық реакциясы жөнінде хабар болған.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

Препараттың біріне немесе одан көп ингредиенттеріне аллергиялық (аса жоғары сезімталдық) реакциялары белгілі.

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Басқа дәрілік заттармен өзара байланысуы жөнінде бірде бір жағдай тіркелмеген және гомеопатиялық сұйылтылуына байланысты күтілмейді.

Айрықша нұсқаулар

Егер симптомдар сақталса немесе нашарласа, Сіз дәрігерден немесе кәсіби медицина қызметкерден кеңес алуыңыз керек.

Бұл өнімнің құрамында лактоза бар. Егер Сізде лактозаны (сүт қантын) көтере алмаушылық болса, бұл дәрілік препаратты қолданудан бұрын дәрігерден кеңес алыңыз.

Жүктілік және лактация кезеңі

Осы препараттың құрамында бар гомеопатиялық сұйылтылған зат, белгілі болғандай жүктілік және лактация кезеңінде ұйыттылық әсер көрсетпейді. Басқа дәрілік препараттар сияқты жүктілік және лактация кезеңінде препаратты қолданудың алдында дәрігерден және фармацевтен кеңес алу керек.

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Автокөлікті басқару және механизмдермен жұмыс жасау қабілетіне әсер ету жағдайы тіркелмеген және гомеопатиялық сұйылтылуына байланысты күтілмейді.

Артық дозалануы

Артық дозалануының бірде бір жағдайы тіркелмеген және гомеопатиялық сұйылтылуына байланысты күтілмейді.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Ақ полипропилен қақпағы бар ақ полипропилен контейнерге 50 таблеткадан салынған.

1 контейнерден медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

Сақталуы

Түпнұсқалық қаптамасында, 30 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

5 жыл

Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханадан босатылу шарттары

Рецептсіз

Өндіруші/Қаптаушы

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Германия

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Германия

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім сапасына қатысты шағымдарды (ұсынымдарды) қабылдайтын; дәрілік заттың тіркеуден кейін қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы

«АЕМ Services» ЖШС

050040, ҚР, Алматы, ел-Фараби даңғ, 75А үйі, 102-103 кеңсе

aemservices@mail.ru

+7 707 798 83 83

Mat.no.: 082550

Version: 5000

Code: 182

Size: 110 x 440 mm

Type size: ≥ 8 Punkt

Colours: ■ Pantone 432

1. Proof ___16.03.2017___AB

2. Proof ___17.03.2017___AB

3. Proof ___27.03.2017___AB

Correction necessary

Approved for printing

Valid until 24.11.2021

Valid until further note

Date/Signature

28.03.2017

Akimzhanova Aliya

-Heel

-Heel

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от « 24 »11 2016 г.
№ N005110

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства**

ЦЕЛЬ

Торговое название

Цель

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Таблетки

Состав на одну таблетку

активные вещества:

Cartilago suis D4	0.30 ¹ мг
Coenzym A D6	0.03 ¹ мг
Embryo totalis suis D4	0.30 ¹ мг
Funiculus umbilicalis suis D4	0.30 ¹ мг
Nadidum D6	0.03 ¹ мг
Placenta totalis suis D4	0.30 ¹ мг
Rhus toxicodendron D2	0.54 ¹ мг
Sanguinaria canadensis D3	0.45 ¹ мг
Solanum dulcamara D2	0.15 ¹ мг
Sulfur D6	0.54 ¹ мг
Symphytum officinale D8	0.15 ¹ мг
Arnica montana MT=D1	0.60 ¹ мг
Acidum silicicum D6	3.00 мг
Acidum thiocticum D6	0.03 мг
Natrium diethyloxalacetikum D6	0.03 мг

вспомогательные вещества:

лактоза моногидрат 296.94 мг, магния стеарат 1.5 мг

¹ - Используется в виде водно-спиртовых разбавлений, вода и этанол удаляются в процессе производства

Описание

Таблетки круглой формы, с плоской поверхностью, от белого до желто-белого цвета, с фаской, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и прочие.

Код АТХ M09AX

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Исследовать фармакокинетические свойства гомеопатических препаратов не представляется возможным.

Фармакодинамика

Цель представляет собой комплексный гомеопатический препарат. Цель оказывает защитное действие против повреждения хряща и облегчает восстановление хряща путем активации регуляторных клеток и факторов. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ, содержащихся в составе препарата.

Показания к применению

Артроз/остеоартрит и/или ревматические заболевания суставов.

Способ применения и дозы

Способ применения и дозировка:

Стандартная дозировка:

Взрослые (и дети старше 12 лет):

По 1 таблетке 3 раза в день.

Дети 6-11 лет: 1 таблетка 2 раза в день.

Первоначальная дозировка при остром состоянии:

Взрослые (и дети старше 12 лет):

1 таблетка каждые ½ часа -1 час до 12 таблеток ежедневно, затем продолжить в стандартной дозировке.

Дети 6-11 лет: 1 таблетка каждые 1 - 2 часа, до 8 раз в день, затем продолжить в стандартной дозировке.

Продолжительность лечения

Первоначальная дозировка при остром состоянии применяется несколько дней, обычно от 2 до 3 дней.

Стандартное лечение длится около 1-2 месяцев.

Способ применения:

Внутрь.

Предпочтительно позволить таблетке раствориться в ротовой полости, а затем проглотить.

Для детей можно измельчить таблетку и всыпать в небольшое количество воды. Это лекарство должно быть принято натощак либо в промежутках между приемами пищи.

Побочные действия

Как и все лекарства, это гомеопатическое лекарство может вызвать побочные эффекты. В единичных случаях сообщалось о кратковременной кожной аллергической реакции.

Противопоказания

Известны случаи аллергии (гиперчувствительности) к одному или более ингредиентам препарата.

Лекарственные взаимодействия

Ни одного случая взаимодействия с другими лекарственными препаратами не зарегистрировано и не ожидается в связи с гомеопатическим разведением.

Особые указания

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, вы должны проконсультироваться с врачом или профессиональным медицинским работником.

Этот продукт содержит лактозу. Если у вас есть непереносимость лактозы (молочного сахара), проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот лекарственный препарат.

Беременность и период лактации

Гомеопатические разведения веществ, присутствующих в составе данного препарата, как известно, не оказывают токсичного действия при беременности и период лактации. Как и со всеми лекарственными препаратами, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед началом применения препарата во время беременности и в период лактации

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Случаев влияния на способность управления автотранспортом и работу с механизмами не зарегистрировано и не ожидается в связи с гомеопатическим разведением

Передозировка

Ни одного случая передозировки не зарегистрировано и не ожидается в связи с гомеопатическим разведением.

Форма выпуска и упаковка

По 50 таблеток помещают в белый полипропиленовый контейнер с белой полипропиленовой крышкой.

По 1 контейнеру вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель/Упаковщик

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Германия

Держатель регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Германия

Адрес организации на территории Республики Казахстан: принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей; ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «АЕМ Services»

050040, РК, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 102-103

aemservices@mail.ru

+7 707 798 83 83

-Heel