



Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау министрлігі  
Фармация комитеті төрағасының  
2019 жылғы «05» 04  
№ N020635 бұйрығымен  
БЕКІТІЛГЕН

082668/5002 KZ

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом председателя  
Комитета фармации  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от «05» 04 2019 г.  
№ N020635

Дәрілік затты медициналық қолдану  
жөніндегі нұсқаулық

## СПАСКУПРЕЛЬ

**Саудалық атауы**  
Спаскупрель

**Халықаралық патенттелмеген атауы**  
Жоқ

**Дәрілік түрі**  
Инъекцияға арналған ерітінді, 1.1 г

### Құрамы

1 ампуланың (1.1 г) ішінде  
*белсенді заттар:*

Aconitum napellus D6	2.20 мг
Amanita muscaria D4	0.55 мг
Ammonium bromatum D4	1.10 мг
Atropinum sulfuricum D6	1.10 мг
Chamomilla recutita D3	0.55 мг
Citrullus colocynthis D4	1.10 мг
Cuprum sulfuricum D6	0.55 мг
Gelsemium sempervirens D6	1.10 мг
Magnesium phosphoricum D6	1.10 мг
Passiflora incarnata D2	0.55 мг
Veratrum album D6	1.10 мг

*қосымша заттар:* натрий хлориді, инъекцияға арналған су.

### Сипаттамасы

Мөлдір түссіз, иіссіз ерітінді

### Фармакотерапиялық тобы

Басқа препараттар. Басқа емдік препараттар, барлығы. Басқа дәрілік препараттар. АТХ коды V03AX

### Фармакологиялық қасиеттері

#### Фармакокинетикасы

Гомеопатиялық препараттардың фармакокинетикалық қасиеттерін зерттеу мүмкіндігі болмады.

#### Фармакодинамикасы

Спаскупрель кешенді гомеопатиялық препарат болып табылады, әсері, оның құрамына кіретін компоненттерге негізделген. Спаскупрель тегіс бұлшықет жасушаларының тонусын реттей отырып, АІЖ ағзаларының және несеп шығару жүйесінің түйіліп ауыруын басады.

### Қолданылуы

Кешенді емде

- асқазан-ішек жолының және несеп шығару жүйесінің тегіс бұлшықеттерінің түйілуінде.

### Қолдану тәсілі мен дозалары

#### Стандартты доза

Ересектерге (және 12 жастан асқан балаларға):

1 ампуладан аптасына 1-ден 3 ретке дейін.

2-ден 5 жасқа дейінгі балаларға: ½ ампуладан

(0.5 мл) аптасына 1-ден 3 ретке дейін.

6-дан 11 жасқа дейінгі балаларға: ⅓ ампуладан

(0.7 мл) аптасына 1-ден 3 ретке дейін.

#### Жедел жағдайда бастапқы доза

Ересектерге (және 12 жастан асқан балаларға):

1 ампуладан күнделікті, содан кейін стандартты

дозада жалғастыру.

2-ден 5 жасқа дейінгі балаларға: ½ ампуладан

(0.5 мл) күнделікті, содан кейін стандартты доза

да жалғастыру.

6-дан 11 жасқа дейінгі балаларға: ⅓ ампуладан

(0.7 мл) күнделікті, содан кейін стандартты доза

да жалғастыру.

#### Емдеудің ұзақтығы

Жедел жағдайда бастапқы доза бірнеше күн

қолданылуы мүмкін, әдетте 2 күннен 3 күнге

дейін (күнделікті инъекциялар). Стандартты емдеу

әдетте шамамен 2 апта жалғасады.


#### Енгізу тәсілі:

Спаскупрель инъекцияға арналған ерітіндісі тері

астына, тері ішіне, бұлшықет ішіне, немесе вена

ішіне енгізілуі мүмкін.

### Шыны ампуланы ашу жөніндегі нұсқаулық:



Ампуланы ашу үшін оны кесудің қажеті жоқ. Ампуланы нүкте түрінде таңбалауы бар бұрышымен жоғары ұстаңыз, сұйықтық түбінде болмайынша сілкіңіз немесе оны ұрғыңыз. Ампуланың басын таңбалауға қарама-қарсы жаққа басу арқылы сындырыңыз.

### Жағымсыз әсерлері

Жекелеген жағдайларда қысқа мерзімді тері аллергиялық реакциясы туралы хабарланған. Кез-келген ерекше реакция пайда болған жағдайда дәрігермен кеңескен жөн.

### Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препараттың бір немесе бірнеше компонентіне аллергия (аса жоғары сезімталдық).

### Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуінің бірде-бір жағдайы тіркелмеген және гомеопатиялық сұйықтарға байланысты күтілмейді.

### Айрықша нұсқаулар

Егер симптомдар сақталса немесе нашарласа, сіз дәрігермен немесе кәсіби медицина қызметкерімен кеңесуіңіз қажет.

#### Жүктілік және лактация кезеңі

Препарат құрамына кіретін гомеопатиялық сұйықтар

тылған заттардың жүктілік және емшек емізу кезіндегі

уыттылығы зерттелмеген. Жүктілік және емшек

емізу кезінде қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

*Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор*

*механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшелігі*

Көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер етпейді.

### Артық дозалануы

Бірде-бір артық дозалану жағдайы тіркелмеген және гомеопатиялық сұйықтарға байланысты күтілмейді.

### Шығарылу түрі мен қаптамасы

1.1 г-нан түссіз шыны ампулада, ампуланың жоғарғы жағында түрлі түсті таңбалаған нүкте.

5 ампуладан ПВХ жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.

Пішінді ұяшықты қаптама медициналық қолдану жөнінде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

### Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамасында, 9 °С-ден 29 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

### Сақтау мерзімі

5 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

### Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства

## СПАСКУПРЕЛЬ

**Торговое название**

Спаскупрель

**Международное непатентованное название**

Нет

**Лекарственная форма**

Раствор для инъекций, 1.1 г

### Состав

1 ампула (1.1 г) содержит  
*активные вещества:*

Aconitum napellus D6	2.20 мг
Amanita muscaria D4	0.55 мг
Ammonium bromatum D4	1.10 мг
Atropinum sulfuricum D6	1.10 мг
Chamomilla recutita D3	0.55 мг
Citrullus colocynthis D4	1.10 мг
Cuprum sulfuricum D6	0.55 мг
Gelsemium sempervirens D6	1.10 мг
Magnesium phosphoricum D6	1.10 мг
Passiflora incarnata D2	0.55 мг
Veratrum album D6	1.10 мг

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

### Описание

Прозрачный бесцветный раствор, без запаха

### Фармакотерапевтическая группа

Прочие препараты. Другие терапевтические препараты все. Другие лекарственные препараты.

Код АТХ V03AX

### Фармакологические свойства

#### Фармакокинетика

Исследовать фармакокинетические свойства гомеопатических препаратов не представляется возможным.

#### Фармакодинамика

Спаскупрель представляет собой комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Спаскупрель устраняет спастические боли в органах ЖКТ и мочеполовой системы, регулируя тонус гладко-мышечных клеток.

### Показания к применению

В комплексной терапии

- при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

### Способ применения и дозы

#### Стандартная дозировка

Взрослым (и детям старше 12 лет): 1 ампула от 1 до 3-х раз в неделю.

Детям от 2 до 5 лет: ½ ампулы (0.5 мл) от 1 до 3-х раз в неделю.

Детям от 6 до 11 лет: ⅓ ампулы (0.7 мл) от 1 до 3-х раз в неделю.

*Первоначальная дозировка при остром состоянии*

Взрослым (и детям старше 12 лет): 1 ампула

ежедневно, затем продолжить в стандартной дозировке.

Детям от 2 до 5 лет: ½ ампулы (0.5 мл) ежедневно, затем продолжить в стандартной дозе.


Детям от 6 до 11 лет: ⅓ ампулы (0.7 мл) ежедневно, затем продолжить в стандартной дозе.

#### Продолжительность лечения

Первоначальная дозировка при остром состоянии может применяться несколько дней, как правило, от 2 до 3 дней (ежедневные инъекции). Стандартно лечение обычно продолжается около 2 недель.

#### Способ введения:

Спаскупрель, раствор для инъекций, может быть введен подкожно, внутривенно, внутримышечно или внутривенно.



Чтобы открыть ампулу не нужно ее надрезать. Держите ампулу под углом, маркировкой в виде точки вверх, стряхните или постучите по ней, пока жидкость не окажется в нижней части. Обломайте головку ампулы путем нажима в сторону, противоположную маркировке.

### Инструкция по открытию стеклянной ампулы:



Чтобы открыть ампулу не нужно ее надрезать. Держите ампулу под углом, маркировкой в виде точки вверх, стряхните или постучите по ней, пока жидкость не окажется в нижней части. Обломайте головку ампулы путем нажима в сторону, противоположную маркировке.

### Побочные действия

В единичных случаях сообщалось о кратковременной кожной аллергической реакции. В случаях появления любых необычных реакций необходимо проконсультироваться с врачом.

### Противопоказания

- аллергия (гиперчувствительность) к одному или более компонентам препарата.

### Лекарственные взаимодействия

Ни одного случая взаимодействия с другими лекарственными препаратами не зарегистрировано и не ожидается в связи с гомеопатическим разведением.

### Особые указания

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, вы должны проконсультироваться с врачом или профессиональным медицинским работником.

#### Беременность и период лактации

Не изучена токсичность гомеопатически разведенных веществ входящих в состав препарата при беременности и грудном вскармливании. Необходимо проконсультироваться с врачом перед применением во время беременности и грудного вскармливания.

*Особенности влияния лекарственного препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

### Передозировка

Ни одного случая передозировки не зарегистрировано и не ожидается в связи с гомеопатическим разведением.

### Форма выпуска и упаковка

По 1.1 г в ампулы бесцветного стекла, в верхней части ампулы цветная маркировочная точка. По 5 ампул в контурную ячеиковую упаковку из ПВХ. Контурную ячеиковую упаковку вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

### Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 9 °С до 29 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

### Срок хранения

5 лет

Не применять по истечении срока годности.

### Условия отпуска из аптек

По рецепту

Mat.no.: 082668

Version: 5002

Code: 32

Size: 148 x 600 mm

Type size: ≥ 8 Punkt

Colours: ■ Pantone 432

1. Proof \_\_14.05.2019\_\_ban  
2. Proof \_\_15.05.2019\_\_ban  
3. Proof \_\_17.05.2019\_\_ban  
4. Proof \_\_21.05.2019\_\_EII

Correction necessary

Approved for printing

Valid until 20/01/2022

Valid until further note

### Date/Signature

23/05/2019

Akimzhanova Aliya

**-Heel**

**-Heel**

**Өндіруші**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  
76532 Баден-Баден, Германия

**Тіркеу куәлігінің иесі**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  
76532 Баден-Баден, Германия

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттардың сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын, дәрілік заттың тіркөуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері (телефон, факс, электронды пошта)  
«АЕМ Services» ЖШС  
050040, ҚР, Алматы қ-сы, әл-Фараби даңғылы,  
75А үй, 102-103 кеңсе  
[aemservices@mail.ru](mailto:aemservices@mail.ru)  
**+7 707 798 83 99**

**Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  
76532 Баден-Баден, Германия

**Владелец регистрационного удостоверения**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  
76532 Баден-Баден, Германия

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии (предложения) от потребителей по качеству лекарственных средств, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства  
ТОО «АЕМ Services»  
050040, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,  
дом 75А, оф. 102-103  
[aemservices@mail.ru](mailto:aemservices@mail.ru)  
**+7 707 798 83 99**